

В.В.ДУБЕНСКИЙ д.м.н. профессор, **Р.В.РЕДЬКО**
Кафедра кожных и венерических болезней ТГМУ, г. Тверь

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРОСТЫХ БОРОДАВОК У ДЕТЕЙ

В сб.: Возрастные аспекты дерматологии, венерологии и косметологии. Материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 70-летию РМАПО. М., 2000

Лечение вирусных бородавок остается одной из сложных проблем современной клинической дерматологии, поскольку результаты известных методов лечения не удовлетворяют врачей и родителей. Использование противовирусных мазей оказывает незначительный клинический эффект, а применение деструктивных методов (химиодеструкция, криотерапия, электрокоагуляция, лазеродеструкция) приводит к местным постоперационным осложнениям, обширным рубцам и частым рецидивам.

Целью настоящего исследования является оценка эффективности комплексной терапии с использованием интерферона и радиоволновой хирургии на аппарате «Surgitron».

Под нашим наблюдением находилось 38 детей в возрасте от 3 до 12 лет. Ранее больные неоднократно получали лечение с использованием деструктивных методов и противовирусных средств. У части из них рецидивирующие бородавки имели атипичный вид на месте деструкции: плоская форма элементов, рост по периферии до 3 см в диаметре. Кроме того, наблюдался распространенный процесс с вовлечением кожи тыла кистей, пальцев рук, нижних конечностей и лица.

Показатели иммунограммы указывали на дисбаланс клеточного звена иммунитета и интерфероногенеза.

На первом курсе лечения мы использовали препараты интерферона- α , вводя их посредством ингаляций по 5-10 тыс. ЕД на сеанс, курсом 10-15 процедур. После окончания интерферонотерапии часть элементов разрешалась, другие становились меньше в размерах.

На втором курсе под местной инфильтрационной анестезией проводили удаление бородавок на аппарате «Surgitron» с использованием трех режимов (резекция, коагуляция, фульгурация), что позволяло удалять глубоколежащую основу элементов и избегать кровотечения. Полное заживление происходило на 8-12 сутки после удаления. Через 1 месяц проводили повторный курс интерферонотерапии.

Отдаленные наблюдения в сроки от 1 до 2,5 лет установили стойкое излечение у 97,3% детей. Клиническое излечение коррелировало с восстановлением иммунологических показателей.

Таким образом, предложенный метод лечения является качественно новым в терапии вирусных бородавок и приводит к низкому проценту рецидивов и постоперационных осложнений.